Les risques de la voie Intrathécale

Prof. Pascal ODOU
Prof. Pascal BONNABRY, Dr Jean-Marie CANONGE

GERPAC

Hyères, 7-9 octobre 2009

Université Lille 2
Droit et Santé

Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille

Généralités

- ▶ SNC isolé du reste de l'organisme
 - ▶ BHE qui sépare le sang du tissu nerveux
 - ▶ BHM qui sépare le sang du LCR
 - ▶ Passage uniquement des médicaments lipophiles

→ passage difficile des médicaments par voie conventionnelle

→ D'où l'utilisation de la voie Intrathécale

▷ 2

Rappels Anatomiques

- ▶ Méninges protégeant moelle + racines
 - ▶ *dure-mère*
 - ▶ *l'arachnoïde*
 - ▶ *la pie-mère*
- ▶ Espace péri-dural très vascularisé
- ▶ Espace sous-arachnoïdien renferme le LCR

▷ 3

Définitions

- ▶ Voie intrarachidienne = voie intrathécale
 - ▶ Injection au-delà de la dure-mère et de l'arachnoïde, dans l'espace sous-arachnoïdien contenant le LCR
 - ▶ Volume injecté entre 1 mL et 10 mL

A ne pas confondre avec :

- ▶ Voie épidurale
 - ▶ Injection de substances médicamenteuses, anesthésiques ou autres, dans l'espace épidural séparant le canal rachidien de la dure-mère
 - ▶ Volume injecté entre 5 mL et 10 mL

▶ 4

▶ 5

Complications liées au geste

- ▶ Injection du médicament par inadvertance dans l'espace péridural ou sous-dural et non dans l'espace sous arachnoïdien.
 - ▶ Fréquence > 10%
- ▶ Conséquences
 - ▶ atteinte nerveuse,
 - ▶ fuite de LCR,
 - ▶ hématome suite à une brèche vasculaire,
 - ▶ Ischémie
 - ▶ migration du cathéter,
 - ▶ pneumoencéphalie...

1) Biboulet & Capdevila. Blocs périmédullaires. In: Anesthésie locorégionale. Paris, Masson, 1995; 64-

▶ 6

Complications inflammatoires

▶ Infections nosocomiales (abcès épiduraux ou de méningites)

- ▶ Les réservoirs implantables ont un taux d'infections non négligeable compris entre 2,6% et 38 %.

▶ Méningites aseptiques (Antiseptique, détergent, amidon présent sur les gants...)

2) Hodgdon et al. The Neurotoxicity of drugs given intrathecally (spinal). *Anesthesia and Analgesia* 1999; 88: 797.

3) Prescrire Rédaction. Intrarachidiennes et épidurales : des voies d'administration à haut risque. *La Revue Prescrire* 2003; 23: 591-602.

▶ 7

Complications hématologiques

▶ Hématome intrarachidien suite à la prise d'anticoagulant par le patient

▶ Conséquences :

- ▶ Troubles neurologiques et paralysie définitive

▶ 8

Complications liés au médicament injecté

A) Réactions aux excipients

- ▶ Chélateur du calcium (EDTA, Citrate)
 - ▶ Baisse de l'agrégation plaquettaire → risque hémorragique
 - ▶ Altération de la neurotransmission
- ▶ Les conservateurs (Alcool benzylique, Parabens)
 - ▶ brûlure, troubles neurologiques ou désorientation
- ▶ Les antioxydants (les sulfites)

4) Hetherington et al. Potential for patient harm from intrathecal administration of preserved solution *Med J Aust* 2000 :173:14

▶ 9

Complications liés au médicament injecté

B) Réactions liées aux propriétés physico-chimiques des principes actifs

- ▶ concentration,
- ▶ liposolubilité,
- ▶ force ionique,
- ▶ taille particulaire,
- ▶ pH,
 - ▶ Très faible effet tampon du LCR
 - ▶ Le pH doit être compris entre 4 et 8

5) Grouts et al. General considerations in the formulation of drugs for spinal delivery. In Spinal drug delivery, 1999. Elsevier.3

▶ 10

Complications liés au médicament injecté

- ▶ Methotrexate → Exemple le plus connu
 - ▶ Posologie IT 10mg/m² sans dépasser 15mg
 - ▶ Posologies IV largement supérieures (15 à 50 mg/m² voire 3 à 12 g/m²)
 - ▶ Confusion lors de la prescription ou de la préparation
 - ▶ Séquelles neurologiques
 - rares jusqu'à 100mg
 - Mortelles au-delà de 500mg

6) Prescrire Rédaction. Intrarachidiennes et épidurales : des voies d'administration à haut risque. La Revue Prescrire 2003; 23

▶ 11

Complications liés au médicament injecté

C) Réactions liées à la toxicité intrinsèque des principes actifs

- ▶ Anthracyclines → décès par atteinte neurologique
 - Injecté à la place de la cytarabine
- ▶ Mitoxantrone → décès par atteinte neurologique
- ▶ Les alcaloïdes de la pervenche → paralysie douloureuse suivi d'une atteinte bulbaire mortelle.

7) Mortensen et al. Inadvertent intrathecal injection of daunorubicin with fatal outcome. Medical and pediatric oncology 1992; 20 (3): 249-253.

8) Dalle JH, Lambilliotte A, Defachelles AS, Mazingue F, Nelken B. Intrathecal mitoxantrone has to be prohibited. Leukemia 2000; 14 (12): 2323-2324.

9) Dossier du CNHIM 2004 n° 4-5. Anticancéreux: utilisation pratique, 5ème édition: 42-45.

▶ 12