Détermination des causes de non-conformité lors du dosage de calcium dans les mélanges de nutrition parentérale.

Introduction

- Fabrication de 5000 mélanges de nutrition parentérale (MNP) par an.
- Contrôle de la concentration en sodium, potassium, calcium et glucose sur des échantillons prélevés des MNP.

- Dosage par colorimétrie :
(Laboratoire biochimie CHU Nice)

Non-conforme (NC) si l'écart entre la concentration cible et mesurée est supérieur à 20%.

- 1) **NC** reçues : dosage de Ca des MNP ternaires, avec SMOFLIPID® (SMOF) ou MEDIALIPIDE® (MEDIA), 0 alerte sur les MNP binaires.
- 2) Hypothèse : **Interférences liées aux émulsions lipidiques (EL)** ? Une différence de concentration entre le premier dosage NC et un second de contrôle suggère une interférence lors du dosage et non un incident lors de la fabrication.

Objectif : Déterminer l'origine des non-conformités imputables aux EL.

Matériel et Méthode

- Etude **rétrospective** des dosages de Ca des MNP
 - Du 04/04/2022 au 15/06/2022
 - Depuis le 16/06/2022 après élimination d'interférence
- Statistiques** :
 - Test de Student : comparaison des EM avant et après élimination des interférences
 - Khi-2 d'indépendance : proportion des dosages non conformes avant et après élimination des interférences

Résultats

- Etude **rétrospective** du 04/04/2022 au 15/06/2022 : N = 186 dosages, 26 NC (14%)
10 types de formulations standards produites sur la période dont :

P2T SMOF NaCl

- Formulation diluée en SMOF : 1 dosage NC

P2T Média

- Formulation concentrée en MEDIA : 3 dosages NC

P4T SMOF/P2T SMOF

Formulations **concentrées** en SMOF :

- 52 dosages de Ca :
 - 17 P2T SMOF et 35 P4T SMOF
 - 22 dosages NC (42%) : 6 P2T SMOF et 16 P2T SMOF
- EM = $15,36 \pm 10,69\%$
- Emax = 38%

Fiche technique de l'automate (Roche Hitachi System Cobas c 701/702®)

- Causes d'interférences :
 - Concentration en bilirubine
 - Concentration en Hémoglobine
 - Indice lipémique (IL) > 1000 mg/dL**

→ **Dilution automatique au 1/1,16** est effectuée par l'automate si IL > 1000 mg/dL.

Indice lipémique des MNP :

- P2T SMOF : 3313 mg/dL
- P4T SMOF : 3248 mg/dL
- P2T MEDIA : 1600 mg/dL

- Depuis le 16/06/2022* :

P4T SMOF/P2T SMOF

- Dilution au 1/5ème programmée** avant dosage des MNP « P2T SMOF » et « P4T SMOF » → N = 56 dosages.
- Emax = 8.9%.

EM = $3,83 \pm 2,38\%$
 $p=4,05 \times 10^{-13}$

0 dosage NC
 $p=9,28 \times 10^{-8}$

* Résultats mis à jour au 12/09/2022

Conclusion

- Les MNP contenant du SMOF et du MEDIA ont un **IL trop élevé pour le dosage**.
- La dilution de l'automate est insuffisante pour nos formulations en SMOF concentrée → Une dilution plus élevée permet d'obtenir des dosages plus conformes et une amélioration de l'écart entre la valeur cible et réelle mesurée.

- La dilution automatique des MNP MEDIA est suffisante pour limiter les interférences mais ne permet pas d'éliminer totalement les dosages NC (NC = 3). Un travail identique devra être réalisé sur ces MNP afin de vérifier si une dilution au 1/5 diminue les NC et l'EM sur le long terme.